



Yleisanestesia (nukutus)

- Yleisanestesiaa eli nukutusta käytetään leikkauksissa, joihin puudutus ei sovellu. Tällaisia leikkauksia ovat mm. vatsan alueelle tähystystekniikalla tehtävät, ylävartalolle ja kasvojen alueelle tehtävät leikkaukset.
- Nukutus aloitetaan kiinnittämällä valvontalaitteet ja suonikanyyli. Anestesia lääkäri antaa suonikanyylin kautta varsinaiset nukutusaineet.
- Koko nukutuksen ajan potilaan vierellä on sairaanhoitaja, joka yhdessä anestesia lääkärin kanssa valvoo potilaan vointia.
- Potilasta tarkkaillaan leikkauksen jälkeen heräämössä ja sen jälkeen päiväkirurgisella osastolla.
- Mahdollista nukutuksen jälkeistä pahoinvointia ja haavakipua hoidetaan sairaalassa. Kotiin potilas saa mukaansa kipulääkereseptin.
- Nukutuksen jälkeen potilas voi tuntea olonsa väsyneeksi. Hänellä voi olla kurkku- ja lihaskipua, joka häviää parin vuorokauden kuluttua.
- Nukutuslääkkeiden vaikutus kestää jopa 24 tuntia, jona aikana ei ole ajokuntoinen eikä oikeustoimikelpoinen. Lääkkeillä on myös haitallisia yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.