



OHJEITA KORTISONIA SAAVALLE POTILAALLE

Kortisonia käytetään silmätautien hoidossa elimistön tulehdusreaktion rauhoittamiseksi.

Kortisonin annostelu on hyvin yksilöllistä. Silmätaudeissa käytetään usein suurta päiväannosta lyhytaikaisesti.

Lyhytaikaisesti tai pienin annoksin käytettynä kortisoni aiheuttaa harvoin sivuvaikutuksia. Näitä ovat mm. verensokerin kohoaminen, levottomuus ja mielialan vaihtelut.

Etenkin pitkäaikaisesti käytettynä yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat ylipaino, verenpaineen nousu, luuston kalkkikato eli osteoporoosi, harmaakaihi, kasvojen pyöristyminen, ihon näppyläisyys ja infektioiden vastustuskyvyn heikkeneminen.

Kortisoni vähentää elimistön sairausoireita.

Hoitoa saadessanne on tulehdusten ja vammojen hoitoon suhtauduttava erityisen huolellisesti. Tulehdussairauksien yhteydessä ottakaa yhteyttä terveystieteiden tai hoitavaan lääkäriin.

Kertokaa lääkityksestä myös tapaturmien tai leikkaushoidon yhteydessä.

Hoidosta on syytä mainita sen loputtuakin.