

Erityisryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset Pohjoisella ERVA - alueella 2018

Indikaatio →	Immuno-suppressiota aiheuttavat lääkehoidot (ennen lääkityksen aloitusta voidaan antaa myös elävät rokotteet)	Immuno-suppressoivat taudit	HIV -infektio, CD4 lymfosyyttien määrä		DM, sydän-sairaus, kr. keuhko-sairaus	Pernan-poisto	Kr. maksa-sairaus	Munuaisten vajaatoiminta, myöh.vaiheen munuaissairaus, dialyysi	Raskaus	Ruiskuhuumeiden käyttäjät, miehet joilla seksiä miesten kanssa	Alkoholismi, tupakointi	Elinsiirtopotilaat (rokotukset siirtoa harkittaessa tai siirtolistalle laitettaessa)	Ohjeita muista erityisryhmistä: Kantasolusiirron saaneiden ja Neurologisia tauteja sairastavien (MS-tauti, myastenia gravis, Guillan-Barre) rokotaminen	Annos (kts valmisteyhteenveto)
			< 200 solut / µL	≥ 200 solut / µL										
Tetanus, difteria (dT)												1. tehostus 5 v kuluttua		Jos saanut rokotussarjan lapsena, annetaan tehoste iänmukaisesti: < 65 vuotiaille 20 v. välein ja > 65 vuotiaille 10 v. välein
Tetanus, difteria, pertussis (dtaP)									suositellaan postpartum					Vaihtoehtoisesti yksi dT-tehoste voidaan korvata dtaP:lla. Perussarjan tehostus huolehdittava 25 vuotiaana.
HPV														0, 1 ja 6kk , vain 26 ikävuoteen saakka
Vesirokko									suositellaan postpartum					0 ja 3 kk, yli 90%:lla luonnonimmunitteetti
MPR									suositellaan postpartum					0 ja 6 kk, ellei sairastanut tai saanut 2 annosta
Influenssa														vuosittainen rokotus
Pneumokokki														1 annos PCV13. Jos saanut PPSV23, annetaan 1 annos PCV13 ≥ 1 vuoden kuluttua rokotussuojan tehostamiseksi.
Hib														1 annos
Hepatiitti A														0 ja 6 kk.
Hepatiitti B														0 , 1 ja 6 kk (vaste tarkistettava 1kk viimeisen rokotuksen jälkeen).
Meningokokki-konjugaatti														1 annos
Puutiaisaivokuume (TBE)														Ensimmäinen tehoste kaikille 3v kuluttua ja seuraavat iänmukaisesti: <50 vuotiaalle 10v.välein, 50 – 60 vuotiaalle 5 v. välein, >60 vuotiaalle ja immuunipuutteille sille 3 v. välein. Riskialueet: katso www.thl.fi
Polio														Suomen oloissa ei tehostetarvetta
Vyöruusu														1 annos, ei tehostetta. 50 ikävuodesta alkaen.

Katso: www.thl.fi >
[Rokottajan käsikirja](#) >
[Erityisryhmien rokotukset](#)

Erityisen tärkeä! Kuuluu maksuttomana kansalliseen rokotusohjelmaan tai hoitava yksikkö kustantaa.
Rokotusta suositellaan.
Saattaa olla hyödyllinen
Ei normaalioloissa rokotustarvetta
Kontraindikaatio.

Immunosuppressiivinen lääkehoito aikuisilla	
Solunsalpaajahoido	
Biologinen lääkehoito	
Kortikosteroidihoito	mg/vrk
* Hydrokortisoni	100
* Prednisoloni	20
* Prednisoni	20
* Metyyliprednisoloni	16
* Deksametasoni	2

Työryhmä:

LSHP, Infektio-sairaalahygienia
PPSHP, Infektioiden torjuntayksikkö
Hyväksytty 10.7.2018